

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.11.2021-12107

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	100 ml/da	42 gün
	Tahıl külemesi (<i>Erysiphe graminis</i>)	75 ml/da	
	Sarı pas (<i>Puccinia striiformis</i>)	75 ml/da	
	Buğdayda başak yanıklığı (<i>Fusarium culmorum</i> , <i>Fusarium graminearum</i>)	100 ml/da	
	Fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Bipolaris sorokiniana</i>)	100 ml/da	

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yanına kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLENMESİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposuna güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıya ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



VERBEN®

Emülsiyon Konsantr (EC)

Grup	3	13	Fungisit (Mantar ilacı)
------	---	----	-------------------------

200 g/l Prothioconazole + 50 g/l Proquinazid

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Biki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 3/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız.
Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
İnsan zehirlenme vakaları bilinmemekte ve deneysel zehirlenme semptomları bilinmemektedir.
İLK YARDIM ÖNEMLERİ:
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz.

Yutulması halinde: Tıbbi bakım alınız. Doktor veya toksite merkezi tarafından söylenmediği sürece KUSTURMAYINIZ. Kazazede bilinçli ise: Ağzı suyla çalkalayınız.
Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalırsa doktora başvurunuz. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir.
Deriyle teması durumunda: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
Gözle teması halinde: Kontakt lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki **Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)** telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : 114

* DuPont'un tescilli markasıdır.



Net Miktar:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Prothioconazole, Proquinazid
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P261 Sisi/buharları/spreyi solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ürünü yalnızca kendi orijinal ve uygun etiketli ambalajında saklayınız.
- Ambalajları kuru, serin ve iyi havalandırılan yerde muhafaza ediniz.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile VERBEN™ in fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

DuPont bu bitki koruma ürününün etiketindeki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu bitki koruma ürününün kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesisizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen uygulamalardan meydana gelebilir ki bunlar DuPont'un kontrolü dışındadır. Bu ürün ile tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal uygulama koşulları dışındaki şartlarda yapılan uygulamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan DuPont hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. DUPONT BU BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.



DuPont Turkey
Endüstri Ürünleri
Limited Şirketi

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
02 Kasım 2021

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğdayda septorya yaprak lekesi hastalığına karşı uygulama için genel olarak en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağın çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde , tarla bulağıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalara devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir. Uygulamanın tekrarlanmasının gerektiği durumlarda, ilk ilaçlamadan 21 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.

Buğdayda tahıl küllemesi; hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların, özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Buğdayda sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 oranlı nem ve 15-20 ° C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, son uygulama ile hasta arasındaki süre dikkate alınarak ilk ilaçlamadan 21 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.

Buğdayda başak yanıklığı hastalığına karşı buğday bitkilerinin çiçeklenme devresi ortasında bir uygulama yapılır.

Buğdayda fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına karşı yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde ikinci ve üçüncü uygulamalar ön görülen aralıklarla yapılmalıdır.

Arpa yaprak yanıklığı hastalığının belirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır ve koşullar hastalığın gelişimi için uygun olarak seyrederse ilk ilaçlamadan 21 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

VERBEN® etki mekanizmasına göre Grup 3 ve 13 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için VERBEN® in aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 ve 13 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımında kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan DuPont firması sorumlu tutulamaz.

**VERBEN®**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	3	13	Fungisit (Mantar İlacı)
------	---	----	-------------------------

200 g/l Prothioconazole +50 g/l Proquinazid

ÜRETİCİ FIRMA:

Corteva Agriscience International Sarl
Route de Suisse 160, CH-1290 Versoix,
Cenevre, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

Du Pont de Nemours (France) SAS
82, rue de Wittelsheim
BP 90149 68701
Cernay, Cedex, FRANSA

RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

DuPont Turkey Endüstri Ürünleri Limited Şirketi
Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2
Palladium Tower İş Merkezi, Kat:12
34746 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 687 04 00
Faks: 0 216 687 04 40 / 687 05 30

Teknik bilgi için: + 90 322 355 68 00

Acil durum için: + 90 538 973 22 00

02 Kasım 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



DuPont Turkey
Endüstri Ürünleri
Limited Şirketi

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri