


BREAKER®

240 SC

Isoclast™ active

İNSEKTİSİT

Breaker® Teknolojisi Eşsiz Beyaz Sinek Çaresiz



Breaker® 240 SC, içeriğindeki eşsiz Isoclast™ aktif maddesinin gücü ile şimdi de domates ve biberde Sera Beyazsineği mücadelesinde başarılı sonuç sunuyor. Dayanıklılık yönetimine ek olarak sistemik ve translaminar etki özellikleriyle de Breaker® 240 SC üreticilerin öncelikli tercihi olmaya geliyor. Doğru kullanım zamanı ve yöntemi uygulandığında üreticiye galibiyet getiriyor.

BREAKER®

240 SC

Isoclast™ active

İNSEKTİSİT


Sistemik ve translaminar bir etkiye sahiptir. Grup 4C olarak sınıflandırılan yeni etki mekanizması sayesinde de Breaker® 240 SC dayanıklılık yönetimi için ideal bir çözümdür.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASI SÜRE
DOMATES (SERA)	Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	30 ml/100 L su (larva - pupa)	7 gün
BİBER (SERA)	Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	30 ml/100 L su (larva - pupa)	1 gün
HIYAR (SERA)	Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	30 ml/100 L su (larva - pupa)	1 gün
MARUL	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>) Marul yaprakbiti (<i>Nasanovia ribisnigri</i>)	15 ml/da (nimf - ergin)	3 gün
PATLICAN (TARLA)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 ml/da (nimf - ergin)	3 gün
ELMA ARMUT	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>) San Jose kabuklubiti (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	10 ml/100 L su (nimf - ergin) 20 ml/100 L su (larva)	14 gün
AYVA	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	10 ml/100 L su (nimf - ergin)	14 gün
ŞEFTALİ / NEKTARİN	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	20 ml/100 L su (larva) 10 ml/100 L su (nimf - ergin)	14 gün
KİRAZ	Kiraz siyah yaprakbiti (<i>Myzus cerasi</i>)	10 ml/100 L su (nimf - ergin)	14 gün
TURUNÇGİL*	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>) Turunçgil kırmızı kabuklubiti (<i>Aonidiella aurantii</i>)	20 ml/100 L su (nimf - ergin)	7 gün
BAĞ**	Turunçgil unlubiti Turunçgil unlubiti	20 ml/100 L su (nimf - ergin)	10 gün

*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak olan bağ alanlarında kullanılmaz.

Sera Beyazsineği (*Trialeurodes vaporariorum*) Yaşam Döngüsü



DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

En iyi sonucun alınabilmesi için beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünde girilir ve her beş adımda alt, orta ve üst yapraklardan birer olmak üzere toplam 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğu görüldüğünde mücadeleye başlanmalıdır.

Bitki koruma ürünlerini güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün broşürünü dikkatlice okuyarak yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 numaralı telefonunu arayınız.

Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00

Breaker® 240 SC ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için +90 322 355 68 00 **nolu telefondan** bizi arayabilirsiniz.

Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.

Taşçı Mahallesi Karataş Bulvarı No: 910 Yüreğir/Adana