

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Sarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 18.01.2019/11287

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre (PHI)
ÇELTİK	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	200 ml/da (Darıcan türlerinin 2-4 yapraklı dönemi)	60 gün
	Çeltiksi darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>)		
	Üç köşeli sandalye sazı (<i>Scirpus mucronatus</i>)		
	Kız otu (<i>Cyperus difformis</i>)		

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda BAXIGA® 32.5 OD aynı bir kaptaki az miktardaki su ile iyice karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposunu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH'si 7 civarında olan temiz su kullanılması gereklidir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulama sırasında hazırlanan karışımın devamlı karıştırılması gereklidir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

BAXIGA® 32.5 OD, çeltik tarımında başta darıcan türleri olmak üzere dar ve geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılır. BAXIGA® 32.5 OD, darıcan türlerinin 2-4 yapraklı döneminde uygulanır; çeltik bitkisi minimum 2 yapraklı dönemde olmalıdır.

Suyu boşaltılmış, tavalara püskürtülerek uygulanır; darıcan türlerinin yaprak yüzeylerinin minimum % 75 - 80'i uygulamaya maruz kalmalıdır. Karışımın tavanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamının kaplanmasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20 ila 40 l/da su kullanılması tavsiye edilir.

BAXIGA® 32.5 OD yabancı otların üzerinde kumduktan sonra, 1 en geç 3 gün içerisinde tavalara su verilir. Su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulup, yabancı otların su altında kalması sağlanmalıdır.

Çeltik tarımında yabancı ot kontrolünde arazi tesviyesi ve uygulama sonrasında çeltik tavalarda tutulan suyun seviyesi çok önemlidir. Bu nedenle, tesviyenin uygun zamanda ve düzgün yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

14 Temmuz 2021

Osman ARI
Daire Başkanı V.

CORTEVA™
agriscience

BAXIGA® 32.5 OD

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUP	B	O	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	---	---	--------------------------------

20 g/l penoxsulam + 12.5 g/l florpyrauxifen-benzyl

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.**

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Ciltte ve gözde tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçebilmek için **Önlem İfadelerini (P280)** dikkate alınız.

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalının bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Tıbbi acil durum tedavisi şart değildir.

Gözler ile temas etmesi halinde: Gözleri açık tutarak yavaş ve yumuşak hareketlerle su içinde 15-20 dakika çalkalayın. İlk 5 dakikadan sonra, varsa, lensleri çıkarıp gözleri çalkalamaya devam edin. Tedavi önerisi almak için zehirlenme kontrol merkezine başvurun. Uygun acil durum göz yıkama çeşmesi çalışma alanında bulunmalıdır.

Deri ile temas etmesi halinde: Bulaşık giysileri üzerinden çıkarm. Cildi 15-20 dakika süreyle bol suyla yıkayın. Tedavi önerisi için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurun. Uygun acil durum güvenlik duşu tesisi çalışma alanında bulunmalıdır.

Solunması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkarın; nefes almıyorsa, acil durum merkezini veya ambulansı aradıktan sonra suni solunum yapın. Suni solunum ağızdan ağıza yapılacaksa, uygulayıcı kurtarıcı koruması (cep maskesi vb.) kullanılmalıdır. Tedavi önerileri için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurun.

ANTİDOTU: Özel bir antipodu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

™ © Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

Net Miktar:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: florpyrauxifen-benzyl, penoxsulam



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Florpyrauxifen-benzyl içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- BAXIGA® 32.5 OD farklı etki mekanizmalarına sahip sistemik etkili florpyrauxifen-benzyl (Rinskor® active) ve penoxsulam içerir.
- Aşırı sıcak, aşırı soğuk, kuraklık, dolu hasarı gibi kültür bitkisinin sağlığını, hassasiyetini ve/veya yabancı ot kontrolünün başarısını etkileyen çevresel stres koşullarının bulunduğu durumlarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.
- Tavsiye edilen ürün ve doz dışında kullanılmayınız.
- Herbisitler için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, uygulama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmamalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapılması tavsiye edilmez.
- Çeltik alanları dışındaki tarım alanlarına yıkanmanın veya direkt akışın olacağı durumlarda BAXIGA 32.5 OD'yı uygulamayınız. Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Uygulamayı takip eden 3 ay içerisinde BAXIGA 32.5 OD kullanılan tarlaların bozulması durumunda, tarlayı 15-20 cm. derinlikte sürdükten sonra çeltik ekilebilir.
- Uygulamayı takip eden sonbahar ve ilkbaharda tüm bitkiler ekilebilir.
- BAXIGA 32.5 OD havuç, pamuk, soya, bağ, tütün, sebzeler, çiçekler gibi geniş yapraklı bitkilere doğrudan ya da çeltik alanlarına yakın ise bu bitkilere sürüklenmesi halinde uygulanmamalıdır. Uygulama sırasında komşu bitkilere sürüklenmesini engelleyin; sisleme şeklinde uygulama yapmayınız.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Uygulama sırasında ilacın komşu bitkilere sürüklenmesini engelleyiniz. Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz. (bkz. "Önlem İfadeleri: P501")

Anlara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız,
Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulama bulaştırmayınız.

CORTEVA™
agriscience

CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş.
ANADOLU KURUMLAR V.D. - 310 000 00 66
Tic. Sicil No: 182593

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BAXIGA® 32.5 OD, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B ve O olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için **BAXIGA® 32.5 OD**'nin aynı üretim sezonu içerisinde, önerilen toplam uygulama sayısını aşmayız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B ve O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir. *Organosilikonlu surfaktanlar* ve *malathion* içerikli insektisitlerle tank karışımı yaparak kullanmayız. **BAXIGA® 32.5 OD** uygulanmış sahada, eğer *malathion* içerikli insektisit uygulanacaksa, en az 7 gün geçtikten sonra uygulama yapılabilir. Karışımında kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.



BAXIGA® 32.5 OD

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUP	B	O	HERBİSİT
			(Yabancı Ot İlacı)

20 g/l penoxsulam + 12.5 g/l florpyrauxifen-benzyl

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında üç (3) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ÜRETİCİ FİRMA

Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, CH-1290,
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ

Corteva Agriscience France S.A.S. ✓
Route de Herrlisheim, 8, Drusenheim,
67410, Fransa


RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No:910
Yüreğir / Adana, Türkiye
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil durum telefonu: +90 538 973 22 00

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

14 Temmuz 2021



Osman ARI
Daire Başkanı V.



CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş.
ANADOLU KURUMLAR V.D. - 310 000 00 66
Tic. Sicil No: 182593

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri