

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 07.07.2014 / 9732

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Turuncgil	İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>)	10 ml/da (Çıkış Öncesi)
	Melez horoz ibiği (<i>Amaranthus hybridus</i>)	
	Yeşil horoz ibiği (<i>Amaranthus lividus</i>)	
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	
	Pireotu (<i>Conyza canadensis</i>)	
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	
	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>)	
	Benekli yatık sütleğen (<i>Euphorbia mutans</i>)	
	Bambul otu (<i>Heliotropium europaeum</i>)	
	Yabani bamyas (<i>Hibiscus trionum</i>)	
	Cam otu (<i>Parietaria judaica</i>)	
	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)	
	İmam kavuğu (<i>Senecio vulgaris</i>)	
	Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	
	Yeşil kirpi darı (<i>Setaria viridis</i>)	
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	
	Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>)	
Elma Armut Ayva Yeni Dünya	İsrgan otu (<i>Urtica urens</i>)	10 ml/da (Çıkış sonrası)
	Gri lekeli amarant (<i>Amaranthus lividus</i>)	
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Pis kokulu köpek papatyası (<i>Anthemis cotula</i>)	
	Portakal nergisi (<i>Calendula arvensis</i>)	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	
	Duvar kazayağı (<i>Chenopodium murale</i>)	
	Kız otu (<i>Cyperus difformis</i>)	
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
	Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)	
	Ebegümeçi (<i>Malva neglecta</i>)	
	Yeşil kirpi darı (<i>Setaria viridis</i>)	
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	
	Dikenli eşek marulu (<i>Sonchus asper</i>)	
	Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>)	
	Kuş otu (<i>Stellaria media</i>)	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda REBELEX® 225 SC aynı bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH' 7 civarında olan temiz su kullanılması gereklidir. Uygulama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarlı veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Devamı sayfa 2'de...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
12 Ekim 2021



REBELEX® 225 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

150 g/l penoxsulam + 75 g/l florasulam

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçebilmek için Önemli ifadelerini (P280) dikkate alınız. Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayınız.

Yutulması halinde: Tıbbi acil durum tedavisi şart değildir.

Gözler ile temas etmesi halinde: Gözleri açık tutarak yavaş ve yumuşak hareketlerle su içinde 15-20 dakika çalkalayın. İlk 5 dakikadan sonra, varsa, lensleri çıkarıp gözleri çalkalamaya devam edin. Tedavi önerisi almak için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurun.

Cilt ile temas etmesi halinde: Kontamine giysileri çıkartın. Deriyi 15-20 dakika boyunca sabun ve bol su ile yıkayın. Tedavi için danışmak üzere bir zehir kontrol merkezine veya doktora başvurun.

Soluması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkarın; nefes almıyorsa, acil durum merkezini veya ambulansı aradıktan sonra suni solunum yaptırın. Suni solunum ağızdan ağıza yapılacaktır, uygulayıcı kurtarıcı koruması (cep maskesi vb.) kullanılmalıdır. Tedavi önerileri için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

© Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Penoxsulam, Florasulam, 1,2-Benzotiyazolin-3-on.



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P302+352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Etiket tavsiyesinde yer almayan bitkilere fitotoksik etki yapabilir.
- Toprak yüzüğü iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
- Toprağın tavında olması gereklidir.
- Yabancı ot bitki koruma ürünleri için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, uygulama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapılması tavsiye edilmez.
- Bahçe bitiminde üst üste uygulama ve doz aşımı yapmaktan kaçınınız.
- Uygulama sırasında ürünün komşu bitkilere sürüklenmesini engelleyiniz.
- Balıkla zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız. Boşalan ambalajları yasalara öngörülen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz. (bkz. "Önemli İfadeleri" P501)

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında üç (3) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

CORTEVA
agriscience
CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş.
YÜREĞİR - 0312 - 310 000 0066
Tic. Sicil No: 85615

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

Sayfa 1'in devamı...

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

REBELEX® 225 SC, **turuncgil bahçelerinde** ilkbaharda **çıkış öncesi** kullanılır; bunun için öncelikle toprak yüzeyi işlenerek, iyice temizlenir, tırmıkla vb. düzeltilip ince ve keseksiz hale getirilir. İyi ve homojen bir etki için, kaplama uygulaması yapılmalıdır.

Elma, armut, ayva ve yeni dünya bahçelerinde, ilkbaharda yabancı otların **erken çıkış sonrası** kaplama uygulama şeklinde kullanılmalıdır. Bu nedenle uygulama öncesinde ilacın toprağa homojen düşmesine engel olabilecek boyutta büyümüş yabancı otlar bulunması durumunda, bunların mekanik olarak temizlenmesi tavsiye edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

REBELEX® 225 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için **REBELEX® 225 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez. Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımında kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.



REBELEX® 225 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

150 g/l penoxsulam + 75 g/l florasulam

ÜRETİCİ FİRMA:

Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, CH-1290,
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

Diachem SpA.
Via Mozzanica, 9/11 – 24043,
Caravaggio (Bergamo) – İtalya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No:910
Yüreğir / Adana, Türkiye
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil durum telefonu: +90 538 973 22 00

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
12 Ekim 2021



Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri