

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 02.11.2016 - 10778

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	
Buğday	Adi yavşan otu	<i>Veronica hederifolia</i>	40 ml/da
	Kısır yabani yulaf	<i>Avena sterilis</i>	50 ml/da
	Püsküllü çayır	<i>Bromus tectorum</i>	
	Uzun süpürge otu	<i>Descurainia sophia</i>	
	Dil kanatan	<i>Galium aparine</i>	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilacı su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanacağına kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

İlaçlama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilacı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu tamamen boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve piskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

WHEATER® 45 OD, yabancı otların çıkışı sonrasında uygulanan bir herbisittir. Yağlı bir formülasyon olan WHEATER® 45 OD su ile karıştırılarak her türlü yer ilaçlama aleti ile rahatlıkla uygulanabilir.

Uygulama 20 - 40 L/da su kullanılarak yapılır. Uygulama sırasında yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

WHEATER® 45 OD, buğdayın kardeşlenme dönemi ortasından sapa kalkma başlangıcına kadar olan devrede; dar ve geniş yapraklı yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde kullanılmalıdır.

Yabancı otların kıştan çıkışta gösterdikleri durgun dönem atlattılmadan; ilkbaharda gelişme yeniden başlamadan önce kullanmayınız.

Buğdayın, kardeşlenme döneminin başlangıcı gibi erken dönemlerinde uygulanması tavsiye edilmez.

Hava sıcaklığının 5°C'in altında olduğu dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez. Hava tahminlerine göre don olayı veya yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez.



WHEATER® 45 OD

Yağda Dağılılabilen (OD)

GRUBU	B	HERBİSİT
-------	---	----------

45 g/l Pyroxsulam + 90 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Akut zehirliliği düşük olduğundan diğer ilaçlarda görülen zehirlenme belirtileri ile karşılaşılabilir. Ciltte ve gözde tahriş ve hassasiyete sebep olabilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Gözleri açık tutarak yavaş ve yumuşak hareketlerle su içinde 15-20 dakika çalkalayın. İlk 5 dakikadan sonra, varsa, lensleri çıkarıp gözleri çalkalamaya devam edin. Bir göz doktoruna başvurun.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi 15-20 dakika sabun ve bol su kullanarak yıkayınız. Bulaşık giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce bulaşık giysilerinizi yıkayınız.

Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ

™ Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı



Net miktar :
Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Pyroxsulam, Cloquintocet-mexyl.



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302/352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305/351/338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P333/313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.

P362/364: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- En iyi etki, yabancı otların hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır.
- İlaçlama öncesi kalibrasyon yapınız.
- Herbisit uygulamalarında yelpaze hüzmeli meme ve mümkünse sürüklenmeyi önleyici tipte donanım kullanılması tavsiye edilir. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
- İlaçlamalarda kullanılacak suyun pH derecesinin 7 (nötr) olması tavsiye edilir.
- Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk, aşırı yağış, besin maddesi noksanlığı, hastalık ve zararlılar gibi nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
- Her türlü su kaynağına bulaştırılmasından kaçınınız.
- Boşalan ürün ambalajlarını başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
- Diğer bitki koruma ürünleri, gübreler ve tohumlar ile gıda ve yem maddelerinden ayrı olarak çocukların ve/veya hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.



CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.
YÜREĞİR V.D. - 370 000 0066
Tic. Sicil No: 85415

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
23 Eylül 2021

Handwritten signature and initials.

Sayfa 1'in devamı...

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

WHEATER® 45 OD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için, **WHEATER® 45 OD**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

WHEATER® 45 OD'nin yaprak gübrelere ve diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. **WHEATER® 45 OD** uygulanmış buğdaya yaprak gübresi uygulanacaksa 7 gün beklenmesi tavsiye edilir. Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımında kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.

MÜNAVABE BİTKİLERİNE ETKİSİ

WHEATER® 45 OD uygulanan buğdaydan sonra aynı tarlaya ekilebilecek ürünlere olumsuz etkisi yoktur.

ETKİ ŞEKLİ

WHEATER 45® OD, buğdayda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili bir herbisit olup, yapraklar ve kısmen de kökler tarafından alınarak yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. İlacın etkili maddesi, Acetolactate synthase (ALS) inhibitörü olduğundan bitki büyüme metabolizmasını bozar ve hedef türleri ölüme götürür.

Uygulamayı takiben, yabancı otların büyümesi hızla durur. Ancak, ölmekte olan bitkilerde renk değişimi gibi tipik semptomların oluşması, şartlara ve yabancı otların hassasiyetine göre değişimle beraber uygulamadan 1 ila 3 hafta sonra görülmeye başlar.



WHEATER® 45 OD

Yağda Dağılabilen (OD)

GRUBU	B	HERBİSİT
-------	---	----------

45 g/l Pyroxsulam + 90 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)

FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşhörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

ÜRETİCİ FİRMA

Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse, 160, CH-1290,
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ

Corteva Agriscience France S.A.S.
Route de Herrlisheim, 8, Drusenheim,
CS10820, Alsace, 67410, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No:910
Yüreğir / Adana, Türkiye
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil durum telefonu: +90 538 973 22 00

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
23 Eylül 2021



Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

Handwritten signature and initials.