

İmal tarihi: Şarj No: 1278/17.12.2021
Son Kullanma Tarihi: Ruhsat tarih ve numarası:

Bitki Koruma Ürününün Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Bağ Mildiyözü (Plasmopara viticola)	200 ml/100 L _{su}	56 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLENMESİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyözü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalar hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşulların sona ermesine kadar 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır. Hastalığın yoğun olduğu dönemlerde ilaçlama aralarını kısa tutunuz.

Asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanması sağlanmalıdır.



Zorvec Vinabria®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	M4;49	Fungisit (Mantar İlacı)
------	-------	-------------------------

500g/L Folpet + 10g/L Oxathiapiprolin

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ,
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ,
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/ VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ,
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 12 SAAT SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

Zehirlenme Belirtileri:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İlk yardım Önemleri:

Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz.

Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalırsa doktora başvurunuz. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir.

Cilt ile temas: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

Göz ile temas: Kontakt lens varsa ve çıkartılması kolayca çıkartınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

Yutulması halinde: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Kazazede bilinçli ise: Ağzı suyla çalkalayınız. 1 veya 2 bardak su içiniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki **Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)** telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

© DuPont'un tescilli markasıdır.



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Folpet, Oxathiapiprolin
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın.
P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
P302 + P352 Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçindekileri yerel, bölgesel ve ulusal yasalara uygun olarak onaylı bir yakma tesisinde bertaraf edin.
P501 Konteynerler yerel, bölgesel ve ulusal yasalara uygun olarak bir atık bertaraf etme tesisinde bertaraf edilmelidir.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- **Zorvec Vinabria®** etikette belirtilen hastalıklara karşı seçici olup, koruyucu ve antispörlant etkisi olan bir fungisittir. Lokal sistemik, translamınar ve ksilemede sistemik olarak hareket edebilir. Oxathiapiprolin ve Folpet aktif maddelerinin içeren süspansiyon konsantre olarak formüle edilmiş bir ilaçtır.
- **Zorvec Vinabria®** bitki dokusuna hızlıca nüfuz eder ve uygulamadan 20 dakika sonra yağın yağmurdan etkilenmez.
- **Zorvec Vinabria®** orijinal ve kapalı ambalajında, kuru ve iyi havalandırılan bir depoda, tohum, yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir yerde depolanmalıdır.
Çevre Koruma Tedbirleri: Direkt suya ve yer üstü sularına yakın yerlere uygulamayınız. Uygulama aletlerini temizlerken çıkan atıkların sulara bulaştırmayınız. Yıkama ile sucul yaşam alanlarına bulaşmayı azaltmak için dik yamaç olan, killi ve toprağı sıkışmış arazilerde uygulama yaptıktan kaçınız.
- **Zorvec Vinabria®** yada Grup 49; M4 olan başka bir fungisit uygulaması toplam uygulama döneminin %33'ünü geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.
- Bağlarda aynı sezon içerisinde 2'den fazla **Zorvec Vinabria®** (yada Grup 49; M4 olan başka bir fungisit) uygulaması yapmayınız.
- Farklı bir etki mekanizmasına sahip bir fungisit ile art arda yada birbirini izleyen sıralarla **Zorvec Vinabria®** uygulaması yapılabilir.
- **Zorvec Vinabria®** (yada 49; M4 olan başka bir fungisit) uygulamasından sonra uygulanacak olan farklı etki mekanizmasına sahip fungisit tedavisi edici özellikle olması gerekmektedir. Eğer bu fungisit tedavisi edici özellikle değilse kısa uygulama aralığıyla uygulanmalıdır.
- **Zorvec Vinabria®** uygulaması koruma amaçlı yapılır.
- **Zorvec Vinabria®** (yada Grup 49; M4 olan başka bir fungisit)'yi bağ fidanlarında kullanmayınız.
- **KULLANMADAN ÖNCE İLACIN ŞİŞESİNİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.**



DuPont Turkey
Endüstri Ürünleri
Limited Şirketi

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

17 Aralık 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Zorvec Vinabria® içerdiği aktif maddeler açısından, Oxathiapiprolin FRAC Grup 49; etki mekanizmasına, Folpet ise FRAC Grup M4 etki mekanizmasına sahip bir fungisitlerdir. Bitki patojenlerini kontrol etmek için aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlı olarak kullanılması, dirençli mantar ırklarının gelişmesine sebep olacak ve bu da hastalık kontrolünü azaltacaktır. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için **Zorvec Vinabria®**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Direncin ortaya çıkması veya gelişmesinin engellenmesi için ilaçlama programına farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4;49; harici) fungisitlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yapıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir. Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan DuPont firması sorumlu tutulamaz.



Zorvec Vinabria®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	M4;49	Fungisit (Mantar İlacı)
------	-------	-------------------------

500g/L Folpet + 10g/L Oxathiapiprolin

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki **Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)** telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

© DuPont'un tescilli markasıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

DuPont bu bitki koruma ürününün etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında etikette yer almayan kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki, bunlar DuPont'un kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan DuPont hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. DÜPONT, BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN, NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Üretici Firma:

Corteva Agriscience International Sarl
Route de Suisse 160, CH-1290
Versoix, İsviçre

Üretim Tesisi:

DuPont de Nemours (France) S.A.S
82, rue de Wittelsheim BP 90149
68701 Cernay Cedex Fransa

Ruhsat Sahibi Firma:

DuPont Turkey Endüstri Ürünleri Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2
Palladium Tower İş Merkezi, Kat:12
34746 Ataşehir/ İstanbul
Tel: 0 216 687 04 00
Faks: 0 216 687 04 40 / 687 05 30

Acil durum için : +90 538 973 22 00

Teknik Bilgi için :+90 322 355 68 00



DuPont Turkey
Endüstri Ürünleri
Limited Şirketi

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri



17 Aralık 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.