

İmal Tarihi: Şarj Numarası:
Son Kullanma Tarihi: Ruhsatname Tarihi ve Numarası: 25.11.2011 / 8465

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OT	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
Çeltik	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	250 ml/da (Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde)
	Çeltiksi darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>)	
	Kızotu (<i>Cyperus difformis</i>)	
	Esmer Venüs otu (<i>Cyperus fuscus</i>)	
	Su ayrığı (<i>Paspalum paspalodes</i>)	
	Biberotu (<i>Polygonum lapathifolium</i>)	
	Güvercin ayağı (<i>Ammannia coccinea</i>)	
	Kındıra (deniz sandalye sazı) (<i>Bolboschoenus maritimus</i>)	
	Tüylü çayır güzeli (<i>Eragrostis pilosa</i>)	
	Dipotu (<i>Lindernia dubia</i>)	
Baraj otu (<i>Diplachne fusca</i>)		

KULLANMA ŞEKLİ

CITADEL, çeltik tarımında başta darıcan türleri olmak üzere dar ve geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılır.

CITADEL, darıcan türlerinin 2-4 yapraklı döneminde uygulanır.

Suyu boşaltılmış, en fazla 1-2 cm derinliğinde su olan çipil halindeki tavalara püskürtülerek uygulanır. İlacın tavanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamının kaplanmasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20 ila 40 l/da su kullanılması tavsiye edilir.

İlaç yabancı otların üzerinde kuruduktan 4-5 saat sonra tavalara su verilebilir. Tavalara su verme işlemi en geç 2 gün içinde yapılmalıdır. Su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulup, yabancı otların su altında kalması sağlanmalıdır.

İLACIN HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile dolduruz. Gerekli miktardaki CITADEL'i bir kaptan az miktardaki su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içine yıkayınız. Karıştırırmaya devam ederek depodun geri kalanını su ile dolduruz.

KALİBRASYON

Tavsiye edilen dozun tavsiye edilen alana doğru ve homojen bir şekilde düşürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığını ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğünü, memelerin altına koyacağınız kaplarda birikecek olan su miktarının her meme için aynı olmasını sağlayarak kontrol ediniz. İlaçlama aletinin deposunu ilaçsız temiz suyla dolduruz ve ardından ilaçlama yapar gibi sabit bir hızla giderek, belirli bir alanı ıslatınız. Daha sonra, ıslatılan alan ve harcanan su miktarını ölçerek, ilaçlama aletinin bir deposu ile ilaçlanabilecek toplam alan ve gerek duyacağınız ilaç miktarını oranı yoluyla hesaplayınız. İlacı, "İlacın Hazırlanması" bölümünde açıklandığı gibi hazırlayarak aletin deposuna boşaltınız. Daha sonra ölçüm yaparken kullandığımız hız ve viteste ilaçlamaya geçiniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CITADEL, sahip olduğu etki mekanizması nedeniyle A ve B Grubu bir herbisit olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için CITADEL'i aynı sezon içerisinde iki defa üst üste kullanmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip, ilaçlar ile dönüşümlü olarak kullanılmasına özen gösteriniz.

UYGULAMA SONRASI ALET TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu tamamen boşaltınız; tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız. Dışını su ile durulayınız. Görülen tüm ilaç kalıntılarını, filtreler ve memeleri temizleyiniz. Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kullanılmadan yapmayınız ve yıkama suyunu kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARŞILIRLILIK DURUMU

Çeltik tarımında kullanılan diğer yabancı ot ilaçları ile karıştırmadan önce firma yetkililerine danışılması tavsiye edilir.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı
GIDA VE KÖRÜLÜM BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARŞILIRLILIK EDİLMİŞTİR

29 Ağustos 2016

DOW Dow AgroSciences
CITADEL™

Yağda Dağılılabilen (OD)

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

GRUP A B HERBİSİT

13.3 g/l penoxsulam + 100 g/l cyhalofop-butyl

Kimyasal Adı:

Benzenesulfonamide 2-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy [1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl) + Butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy) phenoxy]propionate

ÖNCE ETİKETİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAKTA,

KAPALI VE KİLİTLİ OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ,

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINDA OLUŞABİLECEK RİSKLERDEN KAÇINMAK İÇİN KULLANMA TALİMATLARINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN İLACIN BOŞ AMBALAJINA ¼ Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Cildi tahriş edebilir ve cilt ile temasında alerji yapabilir. Gözde hafif tahriş ile hafif kornea hasarına sebep olabilir. Solunum yoluyla aşırı maruziyette üst solunum yolu tahrişi görülebilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalmanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile 15-20 dakika süreyle iyice yıkayın, ilk 5 dakikadan sonra eğer varsa kontak lensleri çıkartınız ve bir süre daha yıkamaya devam edin. Bir doktora, tercihen göz doktoruna danışın.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanılarak 15-20 dakika süreyle iyice yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.



Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın. Acil servise haber verin ve doktor çağırın. Eğer hastanın solunumu durmuşsa, kurtarıcı güvenliğine dikkat ederek, suni teneffüs yaptırın. Yoğun bir maruziyette astım benzeri nefes yolu rahatsızlıklarını tetikleyebilir.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

* ©™™ The Dow Chemical Company ("Dow") kuruluşunun veya Dow'a bağlı şirketlerin ticari markasıdır.

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

	Tahriş Edici Xi		Çevre için Tehlikeli N
---	--------------------	---	---------------------------

İçindekiler: penoxsulam, cyhalofop-butyl

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALAR

R38	Cildi tahriş eder.
R43	Ciltle temas halinde hassasiyet oluşturabilir
R50/53	Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere sebep olabilir.
S24/25	Cilt ve göz ile temasından sakının.
S35	Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S37	Uygun eldiven giyin.
S57	Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

İLACIN ÖZELİKLERİ VE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- CITADEL, tavsiye edilen doz ve dönemde uygulandığında çeltik bitkisine son derece emniyetlidir.
- Tavsiye edilen ürün ve doz dışında kullanmayınız.
- Çeltik tarımında yabancı ot ilaçlamalarının başarısında tesviye ve ilaçlamadan sonra tavalarda tutulan suyun seviyesi çok önemlidir; iyi etki için tesviyenin düzgün yapılmış olması ve ilaçlamadan sonra en geç 2 gün içerisinde tavalara su verilmesi gerekir.
- Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
- Suda yaşayan canlılara zehirlidir. Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
- Uygulama sırasında ilacın komşu bitkilere sürüklenmesini engelleyiniz.
- Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelerine uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

- Diğer ilaçlar, gübreler ve tohumlar ile gıda ve yem maddelerinden ayrı olarak çocukların ve/veya hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Serin, kuru, iyi havalandırılan ve güneş görmeyen yerlerde; açılmamış orijinal ambalajında ağız kapalı olarak saklanmalıdır. Normal şartlar altında, orijinal ambalajında, asgari üç (3) yıl fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI:

Firma, ilacın belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılmasına halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. İlacın yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından ve yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanana aittir.

İMALATÇISI

Dow AgroSciences S.A.S.
BP-20 Zone Industrielle,
67410 Drusenheim - Fransa

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇISI

Dow AgroSciences A.Ş.
İçerenköy Mahallesi Umut Sokak, No: 10/12, AND,
Kat :3, 34752, Ataşehir, İstanbul
www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 6019

DOW Dow AgroSciences Teknik bilgi için: +90 216 571 16 00
Dow AgroSciences A.Ş. ORÇUN GÜRKAN
AND, İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10/12, P.K. 347
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 60 19
Anadolu Kurumlar V.D. 310 000 0066 Ticari Sicil No:182593 - 139103
Ruhsatlandırma Uzmanı