

İmal Tarihi: Sarj Numarası:
Son Kullanma Tarihi: Ruhsatname Tarihi ve Numarası: 13 06 2011 / 8374

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OT	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
Çeltik	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Çeltiksi darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>) Baraj otu (<i>Diplachne fusca</i>) Su ayrığı (<i>Paspalum paspalodes</i>) Tüylü çayır güzeli (<i>Eragrostis pilosa</i>)	150 ml/da (Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde kullanılır)

KULLANMA ŞEKLİ

CLINCHER DUO çeltik ekili alanlarında sorun olan yabancı otlara karşı çikış sonrası, herbisitlere uygun ilaçlama alet ve ekipmanı ile püskürtülerek suyu boşaltılmış (çipil) tavalara uygulanır. İlaçın tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve arazinin tamamı kaplamasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20-40 l/da su kullanılması tavsiye edilir. Tavsiye dozunun aşılmasına dikkat edilmelidir.

Uygulamayı takiben, ilaç yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalara en az 10 cm yüksekliğe kadar su ile doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

İLACIN HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki CLINCHER DUO'yu bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içine yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CLINCHER DUO, sahip olduğu etki mekanizması nedeniyle A Grubu bir herbisit olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için CLINCHER DUO'yu aynı sezon içerisinde iki defa üst üste kullanmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip, CHEROKEE™ veya propanil, bentazone terkipli ilaçlar ile dönüşümlü olarak kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLILIK DURUMU

Propanil, 2,4-D, MCPA ve bentazone terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılması tavsiye edilmez. Eğer çeltik tarlanızda Kız otu, Kurbağa kaşığı, Güvercin yağı ve Kırdıra gibi yabancı otlar var ise CHEROKEE ile karıştırılarak uygulanabilir. CLINCHER DUO içerecek diğer karışımların, uygulama öncesinde küçük bir test alanında denenmesi tavsiye olunur.

UYGULAMA SONRASI ALET TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu tamamen boşaltınız; tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız. Dışını su ile durulayınız. Görülen tüm artıkları, filtreler ve memeleri temiz su ile yıkayınız. Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız ve yıkama suyunu kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız.

DOW Dow AgroSciences

CLINCHER* DUO

Emülsifiye Olabilen Konsantre (EC)

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

GRUP	A	HERBİSİT
------	---	----------

200 g/l cyhalofop-butyl

Kimyasal Adı:

Butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy) phenoxy]propionate

ÖNCE ETİKETİ DİKKATLE OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAKTA,

KAPALI VE KİLİTLİ OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ,

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINDA OLUŞABİLECEK RİSKLERDEN KAÇINMAK İÇİN KULLANMA TALİMATLARINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMAMIŞ KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN İLACIN BOŞ AMBALAJINA ¼ Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Akut zehirliliği düşüktür. Gözde tahrişe neden olabilir. Ciltle teması halinde hassasiyet oluşturabilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalının bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktor çağırın. İstifra ettirme kararı hekim tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika süreyle iyice yıkayın, ilk 1-2 dakikadan sonra eğer varsa kontak lensleri çıkartınız ve bir süre daha yıkamaya devam edin.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayınız. Kirilenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirilenen giysilerinizi yıkayınız.



Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDÖTÜ: Özel bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

* ©™™The Dow Chemical Company ("Dow") kuruluşunun veya Dow'a bağlı şirketlerin ticari markasıdır.

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

	Tahriş Edici		Çevre için Tehlikeli
Xi		N	

İçindekiler: Cyhalofop-butyl

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALAR

R43	Ciltle teması halinde hassasiyet oluşturabilir
R51/53	Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkiler sebep olabilir.
S24	Ciltle temasından sakının.
S35	Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S37	Uygun eldiven giyin.
S57	Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

İLACIN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- CLINCHER DUO, tavsiye edilen doz ve dönemde uygulandığında çeltik bitkisine son derece emniyetlidir.
- Tavsiye edilen türler ve dozlar dışında kullanmayınız.
- Çeltik tarımında yabancı ot ilaçlamalarının başarısında tesviye ve ilaçlamadan sonra tavalarda tutulan suyun seviyesi çok önemlidir; iyi etki için tesviyenin düzgün yapılması ve ilaçlamadan sonra en geç 48 saat içerisinde tavalara su verilmesi gerekir.
- Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmamalıdır. Zırgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
- Suda yaşayan canlılara zehirlidir. Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
- Uygulama sırasında ilacın komşu bitkilere sürüklenmesini engelleyiniz.
- Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
- CLINCHER DUO uygulanmış, çeltik yetiştirme alanlarında münavebeye giren ürünlerde, herhangi bir sorunla karşılaşılması beklenmez.

DEPOLAMA ŞARTLARI

- Diğer ilaçlar, gübreler ve tohumlar ile gıda ve yem maddelerinden ayrı olarak çocukların ve/veya hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Serin, kuru, iyi havalandan ve güneş görmeyen yerlerde; açılmamış orijinal ambalajında ağız kapalı olarak saklanmalıdır. Normal şartlar altında asgari iki (2) yıl fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI:

Firma, ilacın belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. İlacın yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından ve yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanana aittir.

İMALATÇISI

Dow AgroSciences S.A.S.
8 route de Herrlisheim 67410
Drusenheim, Fransa

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇISI

Dow AgroSciences A.Ş.
İçerenköy Mahallesi Umut Sokak, No: 10/12, AND, Kat :3,
34752, Ataşehir, İstanbul
www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 60 19

Teknik bilgi için: +90 216 571 16 00

ORÇUN GÜRKAN

Dow AgroSciences

Dow AgroSciences A.Ş.
AND, İçerenköy Mah. Umut Sk. No: 10/12, P.K. 34752
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye www.dowagro.com.tr
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 60 19
Anadolu Kurumlar V.D. 310 000 0066 Ticari Sicil No:15.211.12.103



Dr. Yunus BAYRAMI
Genel Müdür Yardımcısı V. KABUL EDİLMİŞTİR