

## ACANTO® PLUS

Tavsiye edilen doza ve uygulama yöntemine uyulduğunda;

Özellikle picoxystrobin aktif madde etkisi ile bitki fizyolojisine olumlu etki yapan,

Yaprak yüzey alanı ve fotosentez kapasitesini arttıran,

Daha verimli ve kaliteli ürün alınmasını sağlayan,

İçeriğindeki farklı etki mekanizmalarına sahip aktif maddeleri ile hububatta sap ve yaprak hastalıklarına karşı etkili bir çözümdür.



Corteva Agriscience Türkiye Merkez Ofis  
Tel: 0 322 355 68 00 - Faks: 0 322 503 33 74 - E-mail: iletisim@corveva.com  
www.corveva.com.tr - facebook.com/CortevaTR  
http://www.youtube.com/CortevaAgriscienceTurkiye

**ACANTO® PLUS**  
FUNGİSİT

**Yüksek Verim Ve Kalite İçin  
İdeal Bileşim**



[corteva.com.tr](http://corteva.com.tr)

©™ Corteva Agriscience ve bağlı ortaklarının ticari markasıdır. © 2021 Corteva

# ACANTO® PLUS

## FUNGİSİT



Hububat hastalıkları için geliştirilmiş ve etkili bir çözüm olan Acanto® Plus, yeni nesil strobilurin (picoxystrobin) ve triazole (cyproconazole) bileşimi ile sap ve yaprak hastalıklarına karşı mücadelede başarılı sonuç verir. Bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olurken ürün kalitesini ve verimliliğini artırır; kârlılığın yükselmesini sağlar.


### Sarı pas hastalığı (*Puccinia striiformis*)

Pas hastalıkları arasında en erken görülenidir ve buğdayın en önemli pas hastalığıdır. Sap, başak ve yapraklarında görülebilmekle birlikte hastalığın asıl görüldüğü bölge yapraklardır. Yaprığın üst yüzeyinde makine dikişi gibi sarı püstüller oluşturur ve yüksek nem ya da yağış hastalığın oluşmasını tetikler.




### Septorya yaprak lekesi (*Septoria tritici*)

İlk belirtileri alt yapraklarda çıkan, çevre koşullarına bağlı olarak üst yapraklara kadar da yayılabilen bir hastalıktır. Yaprığın yeşil kısımlarında küçük, düzensiz ve sarı renkte lekeler oluşturan hastalık epidemi riski içerir. Hastalığın bayrak yaprağa kadar ilerlemesi durumunda ise % 50'ye kadar çıkan kayıplara neden olabilir.



### Tahıl Küllemesi (*Erysiphe graminis*)

Yapraklarda nokta şeklinde beyaz-gri renkte püstüllerin görülmesiyle belirtileri ortaya çıkan hastalığın yayılması uygun koşullarda püstüllerin birleşmesi ve yaprağı tamamen kaplamasıyla olur. Ayrıca hastalık sap ve başağa da yayılır. Hastalığa yakalanan bitkilerde yatma görüldüğü için ürün kaybı yaşanır.



### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

BİTKİ	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASI SÜRE
BUĞDAY	Septorya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	50 ml/da	35 gün
	Tahıl küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )	50 ml/da	35 gün
	Sarı pas hastalığı ( <i>Puccinia striiformis</i> )	50 ml/da	35 gün
MISIR	Mısır yaprak yanıklığı ( <i>Setosphaeria turcica</i> )	100 ml/da	56 gün
ŞEKERPANCARI	Cercospora yaprak lekesi ( <i>Cercospora beticola</i> )	75 ml/da	42 gün
ÇELTİK	Çeltik yanıklığı ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	100 ml/da	56 gün

### DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Hububat hastalıklarına karşı mücadelede etkili sonuç alınabilmesi için tavsiye edilen uygulama dozuna ve hastalıkların dönemlerine göre belirtilen uygulama zamanına özellikle dikkat edilmelidir. Koruyucu amaçlı bir fungusit olan Acanto® Plus'tan en başarılı sonuç hastalığın erken dönemlerine yapılan uygulamadan alınır. Bu dönemde yapılan ilk uygulama ile üçüncü yaprakta en üst seviyede hastalık kontrolü sağlanırken ikinci yaprakta da etki görülür. İkinci uygulama ile de bayrak

yaprağında tam hastalık kontrolü sağlanır ve ikinci yaprakta talent döneminde bulunan hastalık da engellenir. En etkili kontrol için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise uygulama aralıklarıdır. İki uygulama arasında üç hafta bulunmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca bitkiye göre tavsiye edilen uygulama dozuna göre kullanılması da önemlidir.



Tatlı mısır ve silajlık mısır yetiştirilen alanlarda **kullanılmamalıdır.**

Bitki koruma ürünlerini güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün broşürünü dikkatlice okuyarak yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 numaralı telefonunu arayınız.

Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00

Acanto® Plus ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için +90 322 355 68 00 **nolu telefondan** bizi arayabilirsiniz.

Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.

Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladium Tower İş Merkezi, Kat:12 34746 Ataşehir/İstanbul