

ACRECIO™

BİTKİ BESLEME

Acrecio™ Kullanın Başarıyı Kökten Yakalayın



Meyve ağaçları, tarla ve sera bitkilerinin kök sistemlerinin daha hızlı ve güçlü gelişimini teşvik eden Acrecio™, topraktaki mineral besin maddelerinin kolay alınımını sağlar. Acrecio™ çevresel koşulların olumsuz etkilerini azaltarak kökleri büyüme döngüsünün en başından itibaren harekete geçirir. Kaliteli ürün ve yüksek verim için kökten destek sunan Acrecio™ hasatta başarıya ulaştıran güçlü bir başlangıç kaynağıdır.



İçerisindeki NPK elementleri ile temel bir besin kaynağı olan Acrecio™ bitki köklerini en baştan harekete geçirir; güçlü bir kök sisteminin oluşum ve gelişimini hızlandırır.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI			
BİTKİ ADI	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
SERA VE AÇIK TARLA SEBZELERİ (DOMATES, BİBER, PATLICAN)	İlk uygulama fide dikiminde, ikinci ve üçüncü uygulamalar birbirini takiben 2-3 hafta arayla yapılır.		500 ml - 1 L/da 500 ml/da
	Yapraklanma başlangıcından itibaren 2-3 uygulama yapılır.	250-300 ml/da	
MEYVE AĞAÇLARI (ELMA, ARMUT, AYVA, KIRAZ, KAYISI, ŞEFTALİ, NAR, MUZ, NARENCİYE)	İlk uygulama fidan dikiminden sonraki ilk sulamada, ikinci ve üçüncü uygulamalar birbirini takiben 2-3 hafta arayla yapılır.		500 ml/da
KAVUN, KARPUZ, HIYAR	İlk uygulama fide dikiminde, ikinci uygulama bundan 2-3 hafta sonra yapılır.		500 ml/da
	Yapraklanma başlangıcından itibaren 2-3 uygulama yapılır.	250-300 ml/da	
PANCAR	İlk uygulama dört yapraklı dönemde, ikinci uygulama yumru oluşum döneminde yapılır.		500 ml - 1 L/da
	Yapraklanma başlangıcından itibaren 2-3 uygulama yapılır.	250-300 ml/da	
MISIR, KANOLA, AYÇİÇEĞİ, BUĞDAY, ÇELTİK	Ekimden sonra toprağa pülverize edilerek, karık sulama suyuna karıştırılarak veya damlamadan uygulanır.		500 ml - 1 L/da
	Yapraklanma başlangıcından itibaren 2-3 uygulama yapılır.	250-300 ml/da	
PATATES	İlk uygulama ekimden sonra, 2. uygulama yumru oluşum döneminde yapılır.		500 ml - 1 L/da
	Yapraklanma başlangıcından itibaren 2-3 uygulama yapılır.	250-300 ml/da	
BAĞ	Vegetasyon dönemi boyunca 3-4 uygulama yapılır.		500 ml/da
ÇİLEK	İlk uygulama fide döneminde ikinci uygulama bundan 1 ay sonra yapılır.		500 ml/da
KİVİ	Vegetasyon dönemi boyunca 2-3 uygulama yapılır.		500 ml/da



DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Acrecio™'dan en iyi sonuç, etiketinde belirtilen doğru uygulama zamanlarına ve dozlarına uyulduğunda alınır. Tavsiye edilen doz oranının aşılmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Meyve ağaçlarında ve domates, biber, patlıcan bitkilerinde ilk uygulama fide ve fidan dikiminde, ikinci ve üçüncü uygulama ise birbirini takiben 2-3 hafta sonra yapılır.