

DELEGATE®

250 WG

Jemvelva™ active

İNSEKTİSİT

Hedef Yüksek Kazançsa Delegate® Şimdi de Kirazda



Delegate® 250 WG, Spinetoram aktif maddesinin gücü ile şimdi de kirazda başarılı bir zararlı mücadelesi sunuyor. Sezon sonunda hedeflenen yüksek verim, kaliteli ürün ve yüksek kazanç için uygun bir çözüm olan Delegate® 250 WG, ürüne yüksek koruma sağlıyor. Doğru zamanda yapılacak doğru uygulama ile tesadüf olmayan bir başarı sunan Delegate® 250 WG, kiraz sineği mücadelesinde en büyük destekçiniz olacak.

DELEGATE®

250 WG

Jemvelva™ active

İNSEKTİSİT

Suda dağılılabilen granül yapısıyla ve içeriğindeki %25 Spinetoram aktif maddesi ile Delegate® 250 WG, kiraz sineği mücadelesinde hızlı ve etkili sonuç sunarken dayanıklılık yönetiminde de başarı sağlayan bir çözümdür.

| KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| BİTKİ | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASI SÜRE |
| ARMUT | Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>) | 40 g/100 L su (Nimf - ergin) | 7 gün |
| | Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>) | 40 g/100 L su (Larva) | 7 gün |
| ELMA | Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>) | 40 g/100 L su (Larva) | 7 gün |
| ŞEFTALİ / NEKTARİN | Çiçek thrips (<i>Franklinella occidentalis</i>) | 30 g/100 L su (Larva - ergin) | 7 gün |
| PAMUK | Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) | 30 g/da (Larva) | 21 gün |
| | Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>) | 30 g/da (Larva) | |
| ANTEPFİSTİĞİ | Antepfıstığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>) | 30 g/100 L su (Nimf - ergin) | 7 gün |
| Antepfıstığı dal güvesi (<i>Kermania pistaciella</i>) | 35 g/100 L su (Larva) | | |
| KİRAZ | Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>) | 20 g / 100 L su (Ergin) | 3 gün |
| MISIR | Mısır koçankurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i>) | 20 g/da (Larva) | 14 gün |
| | Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>) | 20 g/da (Larva) | |
| BAĞ | Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>) | 20 g/100 L su (Larva - yumurta) | 7 gün (üzüm ve asma yaprağı) |
| | Bağ thripsleri (<i>Rubiothrips vitis</i>) | | |
| | (<i>Mycterothrips albicorni</i>) | | |
| | (<i>Mycterothrips tschirkunae</i>) | 30 g/100 L su (Larva - ergin) | |
| (<i>Thrips tabaci</i>) | | | |

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Kiraz sineğine karşı yapılacak mücadele zamanının saptanması için sarı yapışkan görsel tuzaklar kullanılması önerilir; tuzaklar dekara en az 2-3 adet olacak şekilde, ağacın güneydoğu yönüne, yerden 1.5-2 m yükseklikte meyveli bir dala ve zararlının göreceği şekilde asılır. Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içerisinde uygulama yapılması gerekir. Bahçede yer alan ağaçların tamamına Delegate® 250 WG uygulanır; uygulamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının iyice kaplanmasına dikkat edilmelidir. Genellikle bir uygulama yeterli olsa da tuzaklarda sinek yakalanmaya devam ediyorsa ikinci uygulama yapılabilir.



Kiraz sineği ergini



Mide ve temas etkili bir çözüm olduğu için uygulamada ağacın **tüm yüzeyinin** kaplanmasına mutlaka dikkat edilmelidir.

Bitki koruma ürünlerini güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün broşürünü dikkatlice okuyarak yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 numaralı telefonunu arayınız.

Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00

Delegate® 250 WG ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için +90 322 355 68 00 **nolu telefondan** bizi arayabilirsiniz.

Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.

Taşçı Mahallesi Karataş Bulvarı No: 910 Yüreğir/Adana