

BREAKER™ 240 SC

Tavsiye edilen doza ve uygulama yöntemine uyulduğunda;

Uzun süreli etkin koruma sağlayan,

Yüksek biyolojik etkinliğe sahip,

Direnç yönetimi için ideal bir çözümdür.



Corteva Agriscience Türkiye Merkez Ofis

Tel: 0 322 355 68 00 - Faks: 0 322 503 33 74 - E-mail: iletisim@corteva.com

www.corteva.com.tr - facebook.com/CortevaTR

http://www.youtube.com/c/Corteva

BREAKER™
240 SC

İNSEKTİSİT

Mücadelede Başarısı Tescilli
Tam Zamanında Güçlü Teknoloji



corteva.com.tr

©™Dow AgroSciences, DuPont ya da Pioneer ve bunların bağlı ortaklıkları ya da ilgili sahiplerinin ticaret markası ve hizmet işaretidir. © 2020 Corteva.

BREAKER™ 240 SC

İNSEKTİSİT



Breaker™ 240 SC, önerilen uygulama biçimi ve zamanı ile kullanıldığında bağda önemli bir zararlı olan unlu bite karşı iyi sonuç verir. Agrow tarafından en iyi bitki koruma ürünü seçilen Isoclast™ aktif maddesi sayesinde Breaker™ 240 SC, unlu bit kontrolünde başarı sağlar ve bağınızı korur.

Unlu bit (*Planococcus citri*)

Unlu bit, oval, hafifçe şişkin ve vücut üstü toz gibi bir mum örtüsü ile kaplı, vücut kenarında parmaklı mum çıkıntılar olan yaklaşık 3 mm boyunda bir narenciye zararlısıdır.

Bağda önemli bir zararlı olan unlu bit, doğru zamanda mücadele yapılmadığı takdirde ciddi zararlar verir. Unlu bit asmanın her tarafına yayılabilir. Dolayısıyla da yaprak, sürgün, salkım ve gövdede zarar meydana getirir. Bitki özsuyunu emerek beslenen unlu bit, omcanın zayıflamasına, üründen düşmesine ve son noktada da kurummasına neden olur. Ayrıca bitki üzerinde mantar gelişimi ve organların üzerinde küflenme zararlarıyla da üründen kalite kaybı ve ürün kaybı yaşanır.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR			
BİTKİ	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASI SÜRE
MARUL	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>) Marul yaprakbiti (<i>Nasanovia ribisnigri</i>)	15 ml/da (nimf - ergin)	3 gün
PATLİCAN (TARLA)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 ml/da (nimf - ergin)	3 gün
ELMA, ARMUT	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>) San Jose kabuklubiti (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	10 ml/100 L su (nimf - ergin) 20 ml/100 L su (larva)	14 gün
AYVA	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	10 ml/100 L su (nimf - ergin)	14 gün
ŞEFTALİ / NEKTARIN	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	20 ml/100 L su (larva) 10 ml/100 L su (nimf - ergin)	14 gün
KİRAZ	Kiraz siyah yaprakbiti (<i>Myzus cerasi</i>)	10 ml/100 L su (nimf - ergin)	14 gün
TURUNÇGİL*	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>) Turunçgil kırmızı kabuklubiti (<i>Aonidiella aurantii</i>)	20 ml/100 L su (nimf - ergin)	7 gün
BAĞ	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	20 ml/100 L su (nimf - ergin)	10 gün

*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Bağda unlu bit ile mücadele genellikle iki dönemde yapılır. İlki, unlu bitin yeşil aksamı doğru yürümeye başladığı ve korukların yaklaşık nohut büyüklüğünde olduğu dönemdir. İkinci devre, unlu bitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı

devredir. Bu dönemler mevsime göre değişebilir. En yüksek başarı ekonomik zarar eşikleri dikkate alınarak mümkün olan en erken zamanda yapılan uygulamalardan alınır.



Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamalıdır.

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki Dow AgroSciences acil telefon numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Dow AgroSciences Acil: +90 533 336 40 89

Bu ürün Dow AgroSciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow AgroSciences ve DuPont bitki koruma bölümleri Türkiye'de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.

Dow AgroSciences A.Ş. İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10/12 AND Kat:3 Ataşehir/İstanbul