

### KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OT	KULLANMA DOZU
BUĞDAY	<b>DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR</b>	
	Kısır yabani yulaf	<i>Avena sterilis</i>
	Püsküllü çayır	<i>Bromus tectorum</i>
	<b>GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR</b>	
	Boylu papatya	<i>Anthemis altissimum</i>
	Sarıot	<i>Boreava orientalis</i>
	Gökbaş	<i>Centaurea depressa</i>
	Köy göçüren	<i>Cirsium arvense</i>
	Uzun süpürge otu	<i>Descurainia sophia</i>
	Dil kanatan	<i>Galium aparine</i>
Yabani çivit otu	<i>Isatis tinctoria</i>	
Hakiki papatya	<i>Matricaria chamomilla</i>	
Adi yayşan otu	<i>Veronica hederifolia</i>	

### UYGULAMAYA HAZIRLANMA

İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktarda ölçülen **MIKADO 85WG** ilacını başka bir kapta az miktardaki su ile karıştırıp ve iyice erittikten sonra depoya ekleyiniz. Granül formülasyon şekline sahip ilacın tamamen ve rahatça eriyebilmesi için kullanılan suyun çok soğuk olmamasına dikkat ediniz. Karıştırıcı çalıştırarak ilacın depodaki suyla karışması sağlayınız. Daha sonra gerekli miktarda ölçülen **Dassoil 26-2N**'yi bir miktar su ile seyrelterek depodaki ilaç solüsyon içerisine dökünüz ve aletin karıştırıcısı çalışır halde iken depoyu su ile doldurunuz. Hazırlanan ilaç solüsyon uzun süre bekletilmemeli hemen kullanılmalıdır.

### ETKİ ŞEKLİ

**MIKADO 85WG** ilacının her iki etkili maddesi de sistemiktir. Buğdayda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılır. İlaç yapraklar ve kısmen de kökler tarafından alınarak büyüme noktalarına taşınır. İlaç uygulandıktan hemen sonra, yabancı otların büyümesi durur; uygulamadan 1-2 hafta sonra yapraklarda ve büyüme noktalarında sararmalar ve ölü dokular gözlenir; sonuçta yabancı otları 3-4 hafta içinde ölüme götürür.


### KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

**MIKADO 85WG**, toprak rutubetinin yeterli olduğu, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (dar yapraklı türlerin 2 yaprak-4 kardeşli, geniş yapraklı türlerin 2-6 gerçek yapraklı, oldukları dönem) uygulanır. Gökbaş ve köy göçürenin yoğun olduğu tarlalarda, bu türlerin rozet dönemlerini geçmeden uygulama yapılması tavsiye edilir. Yabancı otların kıştan çıkışta gösterdikleri durgun dönem atlatılmadan, yani ilkbaharda gelişme yeniden başlamadan önce kullanılmamalıdır. Buğdayın kardeşlenme dönemi ortasından, sapa kalkma dönemine kadar uygulanabilir; buğdayın, kardeşlenme döneminin başlangıcı gibi erken dönemlerinde veya sapa kalktıktan sonraki geç dönemlerde uygulanması tavsiye edilmez. Ortalama hava sıcaklığının 5°C' in altında olduğu, hava tahminlerine göre don olayı veya yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez.

### KALİBRASYON

Öncelikle, ilaçlanacak sahanın yüzölçümü kesin olarak tespit edilmelidir. Tavsiye edilen dozun birim alana doğru ve homojen bir şekilde düşürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için ilk olarak ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığını ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğünü, memelerin altına koyulacak kaplarda birikecek olan su miktarının her meme için aynı olduğunu kontrol ediniz. İlaçlama aletinin deposunu ilaçsız temiz suyla doldurunuz ve ardından ilaçlama yapar gibi sabit bir hızla giderek, belirli bir alanı iletiniz. Daha sonra, iletılan alan ve harcanan su miktarını ölçerek, bir depo dolusu su ile ilaçlanabilecek toplam alan ve gerek duyacağınız ilaç miktarını orantı yoluyla hesaplayınız. İlacı, "İlacın Hazırlanması" bölümünde açıklandığı gibi hazırlayarak aletin deposuna boşaltınız. Daha sonra ölçüm yaparken kullandığımız hız ve viteste ilaçlamaya geçiniz.

Devamı sayfa 2'de



# MIKADO™ 85WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUP	B	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
------	---	--------------------------------

% 7.08 pyroxsulam + % 1.42 florasulam  
+ % 7.08 cloquintocet-mexyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Akut zehirliliği düşük olduğundan diğer ilaçlarda görülen zehirlenme belirtileri ile karşılaşmaz. Solunum sisteminin hassaslaşmasına veya astıma neden olabilir. Gözde geçici, hafif tahrişe sebep olabilir.

### İLK YARDIM BİLGİLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Maruz kalının bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.**

**Yutulması halinde:** Kusturmayın ve doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

**Gözler ile temas etmesi halinde:** Gözleri açık tutarak yavaş ve yumuşak hakeretlerle su ile 15-20 dakika yıkayın. İlk 5 dakikadan sonra, varsa, lensleri çıkarıp gözleri yıkamaya devam edin. Bir doktora danışınız

**Deri ile temas etmesi halinde:** Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak 15-20 dakika yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.

**Solunması halinde:** Hastayı temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yaptırın. Suni solunum ağızdan ağıza yapılacaksa, uygulayıcı cep maskesi kullanılmalıdır. Tıbbi yardım isteyin.

**ANTİDOTU:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

©The Dow Chemical Company ("Dow") kuruluşunun veya Dow'a bağlı şirketlerin ticari markasıdır.

15 Eylül 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Net miktarı :  
Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: pyroxsulam, cloquintocet-mexyl.



### DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P391:** Döküntüleri toplayın.

**P501:** İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**EUH208:** Pyroxsulam ve cloquintocet-mexyl içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

#### DEPOLAMA DURUMU

- Diğer ilaçlar, gübreler ve tohumlar ile gıda ve yem maddelerinden ayrı olarak çocukların ve/veya hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Serin, kuru, iyi havalandırılan ve güneş görmeyen yerlerde; açılmamış orijinal ambalajında ağız kapalı olarak saklanmalıdır. Normal şartlar altında asgari iki (2) yıl fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korur.

#### FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tabiatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

#### ÜRETİCİSİ

Dow AgroSciences LLC.  
9330 Zionsville Road  
Indianapolis INDIANA  
46268-1054 A.B.D.

#### İMALAT TESİSİ

Schirm GmbH,  
23658 Luebeck, Mecklenburger  
Str. 229  
Almanya

#### RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇISI

Dow AgroSciences A.Ş.  
İçerenköy Mahallesi Umut Sokak, No: 10/12, AND,  
Kat :3, 34752, Ataşehir, İstanbul  
url: [www.dowagro.com.tr](http://www.dowagro.com.tr)  
e-posta: [dasturkev@dowagro.com](mailto:dasturkev@dowagro.com)

**Telefon:** +90 216 571 16 00

**Faks:** +90 216 380 60 19

**Teknik bilgi için:** +90 216 571 16 00



Dow AgroSciences A.Ş.

AND, İçerenköy Mah. Umut Sk. No: 10/12, PK:34752  
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye www.dowagro.com.tr  
Tel: +90 216 571 16 00 Faks: +90 216 380 60 19  
Anadolü Kurumlar V.D. Ş.Ş. 010006 Teş. Sicil No: 152551 - 13393



**UYGULAMA SONRASI ALET TEMİZLİĞİ**

Uygulamadan hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu tamamen boşaltınız; tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız. Dışını su ile durulayınız. Alet deposunun 1/10'unu su ile doldurunuz ve ilaçlama borularının ve memelerin temizlenmesi için aleti çalıştırarak, depoyu tamamen boşaltınız. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz, içine temizleyici bir preparat koyunuz ve ardından depoyu su ile tamamen doldurunuz. Alet karıştırıcısını ve püskürtme mekanizmasını çalıştırarak, boruların ve memelerin temizlenmesini sağlayınız. Aynı işlemleri temiz suyla da tekrar ederek, aletin iyice durulanmasını sağlayınız. Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız ve yıkama suyunu kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

**MIKADO 85WG**, sahip olduğu etki mekanizması nedeniyle **B Grubu** bir herbisit olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, hedef organizma türlerinde direnç gelişimini teşvik edebilmektedir. Bu nedenle, oluşabilecek direnç gelişimini geciktirmek için, aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Daha fazla uygulamanın gerekli olduğu durumlarda, farklı etki mekanizmasına sahip ürünler ile dönüşümlü olarak kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLILIK DURUMU**

**MIKADO 85WG** ilacının yaprak gübrelere ile karıştırılarak uygulanması tavsiye edilmez; ilacın uygulandığı buğdaya yaprak gübresi uygulanacaksa 7 gün beklenmesi tavsiye edilir.

**MIKADO 85WG, DURBAN\* 4** ile karıştırılarak kullanılmaz; iki uygulama arasında 14 gün süre olmalıdır.

**MIKADO 85WG** direnç gelişimi nedeni ile Yabani hardalın (*Sinapis arvensis*) sorun olduğu yerlerde **DMA 500 SL** (2,4-D acid dimethyl amin) ile karıştırılarak da kullanılabilir. **MIKADO 85WG, 26,5 g/da + DMA 500 SL 50 ml/da** dozlarında tank karışımı yapılarak kullanılmalıdır.

**MÜNAVEBE BİTKİLERİNE ETKİSİ**

**MIKADO 85 WG** uygulanan buğdaydan sonra aynı tarlaya ekilebilecek ürünlere olumsuz etkisi yoktur.

**DOW** Dow AgroSciences

**MIKADO™ 85WG**

Suda Dağılabilen Granül (WG)

<b>GRUP</b>	<b>B</b>	<b>HERBİSİT</b> (Yabancı ot ilacı)
-------------	----------	---------------------------------------

**% 7.08 pyroxsulam + % 1.42 florasulam**  
**+ % 7.08 cloquintocet-mexyl**

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- **MIKADO 85WG** aynı pakette birlikte verilen **Dassoil 26-2N** adlı yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
- **MIKADO 85WG** ilacının, dekara ortalama 20 ila 40 litre su ile pülverize edilerek uygulanması tavsiye edilir.
- Herbisit uygulamalarında yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır; mümkünse sürüklenmeyi önleyici tipte donanım kullanılması tavsiye edilir.
- Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, devam eden gece donları, aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı yağış gibi nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.
- Su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.

**DOW** Dow AgroSciences

Dow AgroSciences A.Ş.  
AND, İçerenköy Mah. Umur Sk. No: 10/12 P.K. 34772  
Ataşehir / İSTANBUL / Türkiye www.dowagro.com.tr  
Tel: +90 216 571 15 00 Faks: +90 216 390 00 19  
Web: www.dowagro.com.tr



15 Eylül 2017  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR