

İmal tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarih ve numarası: 27.03.2006 ve 5449

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:



**TALENDO®**

Emülsiyon Konsantr (EC)

Direnç ile ilgili etki mekanizması:

Grup	E1:13	Fungisit (Mantar İlacı)
------	-------	-------------------------

Litrede 200 gram Proquinazid

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ**  
EVDE KULLANMAYINIZ,  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ,  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ  
SOLUMAYINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİRŞEY  
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE  
HAYVAN SOKMAYINIZ.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM  
TALİMATINA UYUNUZ.  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE  
YASAKTIR**  
KULLANILAN ÜRÜNÜN BOS AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ  
SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA  
TANKINA BOSALTINIZ. BU İSLEMI ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**  
Bilinen bir zehirlenme belirtisi bulunmamaktadır.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**  
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız,  
bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Yutulması halinde:** Tıbbi bakım alınız. Doktor veya toksisite merkezi tarafından  
söylenmediği sürece kusturmayınız. Kazazede bilinçli ise: Ağzı suyla  
çalkalayınız.  
**Gözle teması halinde:** Kontakt lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız.  
Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz  
yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.  
**Deriyle teması durumunda:** Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen  
çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması  
durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz.  
Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.  
**Soluması halinde:** Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalırsa  
doktora başvurunuz. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir  
şey vermeyiniz. Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Danışma Merkezi  
(UZEM) telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi  
alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

© DuPont'un tescilli markasıdır.



**İÇİNDEKİLER:** Proquinazid, Fatty acids, C6-12, methylester, Calcium  
dodecylbenzenesulfonate, 2-Ethylhexan-1-ol  
**ZARARLILIK İŞARETİ:**



**TEHLİKELİ  
ZARARLILIK İFADELERİ:**  
H351 Kansere yol açma şüphesi var.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.  
**ÖNLEM İFADELERİ:**  
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280 Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.  
P305 + P351 + P338 Göz ile temaslı halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice  
durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya  
devam ediniz.  
P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım/bakım  
alınız.  
P391 Döküntüleri toplayınız.  
P501 İçindekileri/konteynerleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası  
yönetmeliklere uygun şekilde onaylanmış tesislerde bertaraf ediniz.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma  
talimatlarına uyun.

**KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**  
Talendo® orijinal ve kapalı ambalajında, kuru ve iyi havalandırılan  
bir depoda, tohum, yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir yerde  
depolanmalıdır.

**DEPOLAMA DURUMU:**  
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında depolandığında 3 yıl süre ile  
ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

**ÇEVRE KORUMA TEDBİRLERİ:**  
Balık ve diğer sucul canlılara çok zehirlidir, uzun süreli olumsuz etkilere sebep  
olabilir. Su kaynaklarına, tavsiye edilmediği kültür bitkilerine ve çevreye  
bulaşmayı önleyiniz. Boş ilaç ambalajını herhangi bir amaç için  
kullanmayınız. Boş ambalajları veya ilaç fazlasını usulüne göre imha ediniz.



DuPont Turkey  
Endüstri Ürünleri  
Limited Şirketi

**GENEL BİLGİLER:**

Talendo®, quinazolinone grubundan, Proquinazid etkili maddeli, Bağda Külleme  
(*Uncinula necator*) hastalığına karşı, hastalık etmeninin spor oluşumu ve  
appresorium oluşumuna etki eden, koruyucu bir fungisittir.

**Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar:**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Külleme ( <i>Uncinula necator</i> )	25 ml/100 L su	28 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** İlaçlama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLENMESİ:**

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

Talendo® Bağda Külleme (*Uncinula necator*) hastalığına karşı tavsiye dozunda ve koruyucu olarak (hastalık belirtileri görülmeden) kullanılmalıdır.

- İlaçlama: Bölgelere göre değişimle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaştığında,
- İlaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğünde,
- ve diğer ilaçlamalar: ikinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşünme dönemine kadar yapılır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Talendo® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E1:13 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Talendo®'nun aynı üretim sezonunda içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E1:13 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Aynı yerde bir sezonda 4'ten fazla Talendo® uygulaması yapmayınız.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

03 Mart 2017

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Talendo® bir çok bitki koruma ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın bağda güvenliliği küçük çapta bir uygulama ile denenmelidir. Daha fazla bilgi için ruhsat sahibi ya da satıcı firmaya danışınız.

**FİTOTOKSİTE:**

Talendo® tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

**TALENDO®**

Emülsiyon Konsantr (EC)

Direnc ile ilgili etki mekanizması:

Grup	E1:13	Fungisit (Mantar İlacı)
------	-------	-------------------------

Litrede 200 gram Proquinazid

**FİRMA BEYANI :**

DuPont bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki, bunlar DuPont'un kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan DuPont hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. DUPONT, BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN, NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

**Ruhsat Sahibi:**

DuPont Turkey Endüstri Ürünleri  
Limited Şirketi  
Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2  
Palladium Tower İş Merkezi, Kat:12  
34746 Ataşehir/ İstanbul  
Tel: 0 216 687 04 00

Faks: 0 216 687 04 40 / 687 05 30

Acil Durum Tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

**İmalatçısı:**

DuPont de Nemours and Co.(Inc.)  
974 Centre Road P.O. Box 2915  
Wilmington, Delaware  
19805 ABD

**Fabrika Adresi :**

DuPont de Nemours France SAS  
68701 Cernay Cedex Fransa

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

03 Mart 2017

® DuPont'un tescilli markasıdır.



DuPont Turkey  
Endüstri Ürünleri  
Limited Şirketi