

İmal Tarihi: Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No: Ruhsat tarih ve numarası: 27.03.2006 ve 5449



**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI  
BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Külleme ( <i>Erysiphe necator</i> )	25 ml/100 L su	28 gün
Karpuz	Külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	25 ml/da	7 gün
Domates (tarla)	Patlıcangillerde Külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	25 ml/da	3 gün
Domates (sera)	Patlıcangillerde Külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	25 ml/100 L su	3 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Bağda Külleme (*Erysiphe necator*)** hastalığına karşı tavsiye dozunda ve koruyucu olarak (hastalık belirtileri görülmeden) kullanılmalıdır.

1. İlaçlama: Bölgelere göre değişmekle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaştığında,
2. İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcukları ayrıldığı dönemde,
3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iniliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır. Talendo ile aynı alanda sezonda 4'ten fazla uygulama yapılmamalıdır.

**TALENDO®**

Emülsiyon Konsantr (EC)

Grup	E1:13	Fungisit (Mantar İlacı)
------	-------	-------------------------

200 g/L Proquinazid

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız,  
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz  
Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.  
Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.  
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.  
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Yutulması halinde:** Tıbbi bakım alınız. Doktor veya toksisit merkezi tarafından söylenmediği sürece kusturmayınız. Kazazede bilinçli ise: Ağız suyla çalkalayınız.

**Gözle teması halinde:** Kontakt lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

**Deriyle teması durumunda:** Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

**Soluması halinde:** Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalırsanız doktora başvurunuz. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NÜMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

™ Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Proquinazid, Yağ asitleri, C6-12, methylester, Calcium dodecylbenzenesulfonate, 2-Ethylhexan-1-ol  
**ZARARLILIK İŞARETLERİ:**



**TEHLİKELİ**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

H351 Kansere yol açma şüphesi var.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.  
P305 + P351 + P338 Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.  
P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım/bakım alın.  
P391 Döküntüleri toplayınız.  
P501 İçindekileri/konteynerleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde onaylanmış tesislerde bertaraf ediniz.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

**KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Talendo orijinal ve kapalı ambalajında, kuru ve iyi havalandırılan bir depoda, tohum, yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir yerde depolanmalıdır.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ürün ambalajını herhangi bir amaç için kullanmayınız.
- Boş ambalajları veya ürün fazlasını usulüne göre imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.



CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.  
YÜREĞİR V.Ş. - 319 000 0066  
Tic. Sic. No: 25615

Hüseyin BÜYÜK  
Ruhsatlandırma Lideri

14 Mart 2024  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.





**Karpuzda Külleme (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fulginea*):** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresine (10gün) bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilir. Talendo ile aynı alanda sezonda 3'den fazla uygulama yapılmamalıdır.

**Domates (tarla/sera) Patlıcangillerde külleme (*Leveillula taurica*):** hastalığına karşı tavsiye edilen dozda ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya hastalık için uygun iklim koşulları var ise koruyucu (hastalık belirtisi olmaksızın) olarak kullanılmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 7- 10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilmelidir. Talendo ile aynı alanda sezonda 3'ten fazla uygulama yapılmamalıdır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**Talendo** adlı bitki koruma ürünü , etki mekanizmasına göre Grup E1:13 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için **Talendo**'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E1:13 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. **Grup 13 fungisitlerini ardışık olarak bir kez ve önleyici olarak uygulayınız.** Bir sezonda aynı yerde bağda 4'ten, karpuzda 3'ten, domatesde 3'ten fazla **Talendo** uygulaması yapmayınız.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU:

**Talendo** diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

Karşıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karşımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan Corteva firması sorumlu tutulamaz.



## TALENDO®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	E1:13	Fungisit (Mantar İlacı)
------	-------	-------------------------

200 g/L Proquinazid

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

™ Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

#### FİRMA BEYANI :

Corteva bu ürünün etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ürünün kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zarar, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki, bunlar Corteva'nın kontrolü dışındadır. Bu ürünle tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan Corteva hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. CORTEVA, BU ÜRÜNÜN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN, NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

#### ÜRETİCİ FİRMA:

Corteva Agriscience International Sàrl  
Route de Suisse 160  
CH-1290 Versoix, İsviçre

#### ÜRETİM TESİSİ:

Corteva Agriscience France S.A.S.  
82, Rue De Wittelsheim BP-90149  
68701 Cernay Cedex, Fransa

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Corteva Turkey Tarım A.Ş.  
Taşçı Mah. Karataş Bulvarı No: 910,  
01375, Yüreğir, ADANA  
Tel: +90 322 355 68 00  
Faks: +90 322 503 33 27

Acil Durum için: +90 538 973 22 00



CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.  
YÜREĞİR Y.D. 01375 900 9066  
Tic. Sicil No: 09615

Hüseyin BÜYÜK  
Ruhsatlandırma Lideri

14 Mart 2024  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

